

**Escola Técnica Estadual Professor Massuyuki Kawano**  
**CARDERNO DE QUESTÕES**

1. Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** as lacunas do parágrafo abaixo:

A multiplicação celular responde as necessidades específicas do corpo e é um processo cuidadosamente regulado. Vários estudos mostram que o mecanismo de controle do crescimento celular pode estar na dependência de fatores estimulantes e inibidores, assim, as células sobreviventes se multiplicam até que o tecido se recomponha. Em algumas ocasiões, ocorre a ruptura dos mecanismos reguladores da multiplicação celular, que resulta na formação de \_\_\_\_\_, que pode ser \_\_\_\_\_ ou \_\_\_\_\_. O termo \_\_\_\_\_ refere-se ao desenvolvimento de \_\_\_\_\_.

- a) neoplasia; benigna ou maligna; carcinogênese; tumores benignos
- b) oncopromoção; benigna ou maligna; neoplasia; tumores malignos
- c) carcinogênese; benigna ou maligna; oncopromoção; tumores malignos
- d) tumor/neoplasia; benigna ou maligna; carcinogênese; tumores malignos

2. O ciclo celular corresponde a uma sequência de eventos e apresenta cinco fases: G1, S, G2, M e G0. A duração do ciclo da maioria das células humanas normais é de \_\_\_\_\_, enquanto a duração do ciclo das células dos tumores malignos mais comuns é de \_\_\_\_\_.

- a) 72 a 120 horas; 24 a 48 horas.
- b) 48 a 120 horas; 72 a 120 horas.
- c) 24 a 48 horas; 72 a 120 horas.
- d) 72 a 120 horas; 48 a 120 horas.

3. “A incidência de certas formas de leucemia esteve e está acentuadamente aumentada em sobreviventes das bombas atômicas lançadas sobre o Japão e do acidente atômico ocorrido em Chernobyl”. (FONSECA e PEREIRA, 2013). Quanto à oncogênese física é **CORRETO** afirmar:

- a) A radiação ultravioleta A (RUV-A) não representa risco para o desenvolvimento do câncer de pele, porém a RUV-B é altamente cancerígena.
- b) A energia radiante, solar e ionizante, é o mais importante carcinógeno físico.
- c) A destruição da camada de ozônio tem favorecido o desenvolvimento de câncer de pele em pessoas que estão expostas a RUV-A.
- d) A radioterapia é uma modalidade terapêutica baseada na radiação ionizante, por isso este tipo de radiação não é considerado carcinogênico.

4. Quanto às modalidades de tratamento do câncer é **CORRETO** afirmar:

- a) a quimioterapia e a cirurgia tratam da enfermidade localizada;
- b) a cirurgia e a radioterapia são tratamentos para enfermidade localizada;
- c) a radioterapia trata da enfermidade sistemicamente
- d) a quimioterapia trata da enfermidade localizada

5. Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto às orientações ao paciente oncológico em uso de quimioterápicos antineoplásicos:

- a) fazer bochechos, pelo menos, 3 vezes ao dia com um copo de água filtrada e uma colher (chá) de bicarbonato de sódio.
- b) evitar locais de aglomeração de pessoas, após 10 dias de uso de quimioterápicos devido à diminuição da imunidade.
- c) evitar tirar cutículas, devido ao risco de sangramento e infecção.
- d) tomar um banho diariamente e não realizar higiene íntima, exceto no banho, para evitar esfoliações que promovam infecção.

6. A velocidade da divisão das células normais e cancerosas varia conforme o volume tecidual ou do tumor, respectivamente, ou seja, quanto maior o volume, mais lentamente ocorre a divisão e o inverso é verdadeiro. Assim, um tumor apresenta tempos diferentes de duplicação em momentos diferentes de sua história natural.

Diante do exposto, assinale a alternativa **CORRETA**:

I.Quanto maior o tumor, maior a sua velocidade de divisão, portanto mais sensível será aos medicamentos antineoplásicos (quimioterapia) e às radiações ionizantes (radioterapia), pois menos tempo as células permanecerão em repouso (G0).

II.Quanto mais precoce for a aplicação de quimioterapia ou radioterapia após o tratamento cirúrgico do tumor, mais eficazes elas serão, pois o tumor contém maior número de células em fase proliferativa. Lembrando que, uma vez erradicada parte do tumor, ele tende a crescer novamente.

III.Os tecidos normais que apresentam alta velocidade de divisão celular são os que sofrem maior impacto da ação da terapia antineoplásica, neles concentrando-se os efeitos adversos agudos desses tratamentos como náusea, vômito, diarreia, leucopenia e alopecia, dentre outros, como veremos a seguir no capítulo referente a manejo dos sintomas.

- a) I e II estão corretas
- b) I e III estão corretas
- c) II e III estão corretas
- d) I, II e III estão corretas

**Escola Técnica Estadual Professor Massuyuki Kawano**  
**CADERNO DE QUESTÕES**

7. A radioterapia é uma modalidade de tratamento do câncer que possui três objetivos. O propósito de extinguir todas as células neoplásicas alcança o objetivo \_\_\_\_\_. Quando utilizada para diminuir o tumor ou completar o tratamento cirúrgico e quimioterápico tem-se o objetivo \_\_\_\_\_. E por fim, quando indicada para diminuir as dores localizadas tem o objetivo \_\_\_\_\_. Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** o parágrafo acima:

- a) profilático; terapêutico; paliativo
- b) antálgico; integralizado; sintomático
- c) curativo; remissivo; sintomático
- d) anódino; terapêutico; paliativo

8. Sobre a braquiterapia é **CORRETO** afirmar:

- a) É uma modalidade de tratamento do câncer que envolve procedimento cirúrgico de reconstrução.
- b) É uma modalidade de tratamento do câncer que envolve o implante de radiação interna nas cavidades corporais ou em compartimentos intersticiais e até uso via oral.
- c) Durante o período do implante da braquiterapia, os profissionais de saúde estão expostos a alto risco biológico.
- d) Trata-se de uma modalidade de tratamento do câncer que envolve uso de quimioterápicos antineoplásicos.

9. A grande maioria dos quimioterápicos é administrada por via endovenosa para garantir o nível sérico da droga e sua absorção. Quanto à prevenção do extravasamento de drogas vesicantes assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Evitar o uso de acesso venoso puncionado há mais de 24 horas, mesmo com bom retorno venoso.
- b) Evitar infusão de drogas vesicantes em infusão contínua prolongada (mais de 30 minutos) por veia puncionada com jelco ou scalp.
- c) A fossa cubital, apesar de oferecer as veias mais calibrosas e acessíveis, é terminantemente proibida para infusão de drogas vesicantes.
- d) Após o término da infusão venosa da drogas vesicantes, administrar de 125 a 150ml de S.F. 0.9% em bôlus.

10. A Síndrome da Veia Cava Superior é uma emergência oncológica. Assinale a alternativa que **DESCREVE** os sintomas dessa emergência:

- a) taquipnéia; ingurgitamento venoso do pescoço e da parede torácica; edema de hemiface esquerda; pletora facial; dor torácica; tosse; disartria; edema do membro superior esquerdo.
- b) dispnéia; edema de face; labirintite; edema de hemiface esquerda; pletora facial; dor torácica; sensação de engasgamento; disartria; edema do membro superior.
- c) taquipnéia; labirintite; edema de face; sensação de “cabeça cheia”; pletora facial; dor torácica; tosse; disfagia; edema do membro superior.

d) dispnéia; ingurgitamento venoso do pescoço e da parede torácica; edema de face; sensação de “cabeça cheia”; pletora facial; dor torácica; tosse; disfagia; edema do membro superior.

11. Os Resíduos do Serviço de Saúde são classificados em cinco grupos. Todo material e medicamento utilizado para preparo e administração da medicação quimioterápica a ser descartado pertence ao grupo \_\_\_\_\_, que agrupa os resíduos \_\_\_\_\_ e deve ser identificado por meio de \_\_\_\_\_. Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** o parágrafo acima:

- a) A; químicos; saco plástico amarelo com simbologia específica
- b) C; biológicos; saco plástico laranja com simbologia específica
- c) B; químicos; saco plástico laranja com simbologia específica
- d) D; biológicos; saco plástico amarelo com simbologia específica

12. Os tumores benignos e malignos têm dois componentes básicos: parênquima que é constituído por células neoplásicas e estroma que é composto por tecido conjuntivo e vasos sanguíneos. A nomenclatura dos tumores é baseada na origem das células do parênquima. Nas neoplasias benignas acrescenta-se o sufixo OMA à célula de origem. Os tumores benignos de células mesenquimais geralmente seguem esta regra. Assinale a alternativa das **EXCEÇÕES** a essa regra:

- a) fibroma, hemangioma e leiomioma
- b) osteoma, linfangioma e condroma
- c) rabiomioma, lipoma e mixoma
- d) linfoma, melanoma e mieloma múltiplo

13. Considerando as regras para a nomenclatura dos tumores malignos, assinale a alternativa **CORRETA**:

- 1. Lipossarcoma é um tumor maligno do tecido adiposo de origem mesenquimal.
  - 2. Carcinoma de ovário é um tumor maligno do ovário de origem glandular.
  - 3. Adenocarcinoma gástrico é um câncer de estômago de origem epitelial.
  - 4. Adenocarcinoma de mama é um tumor maligno com padrão glandular.
- a) 1, 2, estão corretas
  - b) 2, 3 estão corretas
  - c) 1, 4 estão corretas
  - d) 3,4 estão corretas

**Escola Técnica Estadual Professor Massuyuki Kawano**  
**CARDERNO DE QUESTÕES**

14. Metástase é a presença de células ou massas tumorais em tecidos que não apresentam continuidade com o tumor primário, considerada a principal característica dos tumores malignos. Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto à disseminação das células tumorais:

- a) A disseminação de células neoplásicas pode ocorrer através da cavidade peritoneal, pleural, pericárdica, subaracnóidea e articular.
- b) A via preferencial das células tumorais são os vasos linfáticos, porém não progridem devido à ação dos gânglios linfáticos regionais.
- c) A disseminação de células neoplásicas pode ocorrer por via hematogênica acometendo principalmente o fígado e os pulmões.
- d) A disseminação linfática de células neoplásicas segue a drenagem linfática normal da área do tumor primário.

15. O tratamento do câncer baseia-se no estadiamento anatômico e no diagnóstico histológico do tumor. Quanto ao estadiamento do tumor, assinale a alternativa **CORRETA**:

I. O sistema TNM informa a extensão do tumor primário; a ausência ou presença e a extensão de metástase em linfonodos regionais; a ausência ou presença de metástase à distância.

II. A tomografia por emissão de pósitrons (PET) permite distinção entre tumores benignos e malignos quando as imagens são duvidosas e quando existe contra-indicação relativa à biópsia.

III. Os marcadores tumorais são substâncias produzidas pelo tumor ou pelo organismo em resposta ao tumor, por isso, o valor alterado dos marcadores definem o diagnóstico de malignidade.

- a) I e II estão corretas
- b) I e III estão corretas
- c) II e III estão corretas
- d) I, II e III estão corretas

16. A via intravenosa é a mais utilizada na terapia antineoplásica. A infusão pode ser feita diretamente por via periférica através de cateteres venosos periféricos ou por via central por meio de cateteres venosos centrais. O cateter totalmente implantado (port-a-cath), geralmente utilizado para terapias antineoplásicas de longa duração permite:

- 1. somente infusão de medicamentos antineoplásicos.
- 2. infusão de medicações antineoplásicas e coleta de sangue para exames.
- 3. a punção do port-a-cath deve ser realizada com agulha tipo huber.
- 4. a punção do cateter port-a-cath, por ser uma atividade assistencial de alta complexidade, compete ao enfermeiro.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) 1, 2, 3, 4 estão corretas
- b) 1, 2, 3 estão corretas
- c) 2, 3, 4 estão corretas

d) 1,3, 4 estão corretas

17. Dentre os fatores de risco para o desenvolvimento dos cânceres, podemos citar as infecções por vírus. Leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **CORRETA**:

1. O sarcoma de Kaposi e o linfoma não Hodgkin estão frequentemente associados ao vírus HIV.

2. *Helicobacter pylori* é um vírus classificado como carcinogênico e está relacionado ao carcinoma e linfoma gástrico.

3. Estudos apontam que mais de 90% dos casos de câncer de colo uterino é atribuído ao *Papilomavírus humano*.

4. Pesquisas revelam que os indivíduos com esquema completo de vacinação contra os vírus da hepatite B e da hepatite C apresentam menor risco para carcinoma de fígado.

- a) 1, 2, 3, 4 estão corretas
- b) 1, 2, 3 estão corretas
- c) 1, 2 estão corretas
- d) 1,3 estão corretas

18. O rastreamento do câncer consiste no exame de pessoas assintomáticas utilizado para classificá-las como passíveis ou não passíveis de ter a doença e tem como objetivo iniciar um tratamento precoce no curso natural da patologia. Leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **CORRETA**:

I. A colpocitologia oncótica cervical (Papanicolaou) não faz o diagnóstico de câncer de colo uterino, mas identifica as anormalidades epiteliais e infecções ginecológicas a serem melhores investigadas e tratadas.

II. O exame anual de pesquisa de sangue oculto nas fezes é indicado para o rastreamento de câncer colorretal para indivíduos com idade superior a 50 anos e sem outros fatores de risco.

III. as mulheres com histórico familiar de câncer de mama (masculino ou feminino) ou de ovário, devem realizar o exame clínico das mamas e mamografia uma vez por ano, a partir dos 35 anos.

- a) I e II estão corretas
- b) I e III estão corretas
- c) II e III estão corretas
- d) I, II e III estão corretas

**Escola Técnica Estadual Professor Massuyuki Kawano**  
**CADERNO DE QUESTÕES**

19. A flebite mecânica, química ou infecciosa é uma complicação relacionada ao procedimento de punção venosa periférica. Identifique a alternativa **INCORRETA** quanto à escala de classificação de flebite:

- a) grau 1: presença de eritema com ou sem dor no local do acesso.
- b) grau 2: presença de dor no local do acesso com eritema e/ou edema.
- c) grau 3: presença de dor no local do acesso com eritema e/ou edema, com endurecimento e cordão venoso palpável.
- d) grau 3: presença de dor no local do acesso com eritema e/ou edema, com endurecimento e cordão venoso palpável maior que 2,5 cm de comprimento e drenagem purulenta.

20. A terapia antineoplásica é realizada, em muitos pacientes, por meio de cateter venoso central. Os cateteres periféricos estão associados à baixa taxa de infecções de corrente sanguínea (ICS), por sua vez os cateteres centrais são responsáveis por aproximadamente 90% das ICS. Assinale a alternativa **CORRETA** quanto aos cuidados com o cateter venoso:

- I. Os dispositivos intravasculares periféricos inseridos em situação de emergência, assim que possível, devem ser trocados, pois a inserção normalmente nessas condições está associada a quebra de técnica asséptica e a lesões traumáticas no vaso.
  - II. A troca das conexões, incluindo os dispositivos de sistema fechado, deve ocorrer dentro de 24 horas para administração de todas as medicações utilizadas no tratamento do paciente oncológico.
  - III. Não se recomenda troca rotineira dos cateteres centrais com o intuito de prevenção, mas sim manter a vigilância ativa nas técnicas de manipulação e observação precisa aos sinais de infecção.
- a) I e II estão corretas
  - b) I e III estão corretas
  - c) II e III estão corretas
  - d) I, II e III estão corretas

21. O derramamento quimioterápico consiste no vazamento de resíduo quimioterápico para o ambiente externo, ocasionando contato com profissional da saúde, equipe de higienização, pacientes, familiares e objetos do local. Assinale a alternativa **CORRETA** quanto às condutas em caso de derramamento:

- 1. Toda a equipe deve saber onde está localizado o Kit de derramamento e deve estar preparada para empregar os equipamentos de proteção individual (EPI).
- 2. O local deve ser evacuado e isolado e, somente o responsável pela descontaminação deverá ficar na área atingida e vestirá o EPI, composto de: macacão ou avental impermeável, propés impermeáveis, gorro, máscara, óculos, dois pares de luvas, cobrindo os punhos.
- 3. A limpeza deverá ser realizada para o centro do derramamento e deverá lavada e enxaguada por três vezes.

Após as três lavadas, todo o material utilizado, exceto os óculos, deverá ser descartado em recipiente próprio com identificação específica para lixo quimioterápico.

4. Todo derramamento deve ser notificado em impresso próprio, para que medidas preventivas sejam adotadas e sejam evitados acidentes futuros.

- a) 1, 2, 3 estão corretas
- b) 2, 3, 4 estão corretas
- c) 1, 2, 4 estão corretas
- d) 1, 2, 3, 4 estão corretas

22. A radioterapia é o uso de radiações ionizantes para o tratamento do câncer. Assinale a alternativa **CORRETA**:

- I. A radioterapia pode ser realizada isoladamente ou associada a outras terapêuticas. Também é indicada para reduzir sangramento, dores e compressões causadas pelo tumor.
- II. A radiocirurgia é um procedimento ambulatorial utilizado geralmente para os tratamentos cerebrais, tais como malformações arteriovenosas, tumores malignos e benignos e doenças funcionais como neuralgia do trigêmeo.
- III. A queda ou não crescimento do pelo no local que está sendo tratado com radioterapia, durante o tratamento, é considerada normal, sendo definitiva na maioria dos casos.

- a) I e II estão corretas
- b) I e III estão corretas
- c) II e III estão corretas
- d) I, II e III estão corretas

23. No planejamento do tratamento mais adequado para cada tipo de tumor, o oncologista utiliza o exame microscópico/histológico do material retirado do tumor. Quanto às modalidades de biópsia é **INCORRETO** afirmar;

- a) A biópsia incisional é destinada a tumor de grande massa, maior que 3 cm de diâmetro e usualmente requer somente anestesia local.
- b) A biópsia excisional, normalmente é aplicada anestesia local e consiste na ressecção cirúrgica por completo da massa tumoral.
- c) A biópsia por agulha pode ser realizada com agulha fina ou com agulha grossa para obtenção de material para exame histológico.
- d) O resultado negativo de qualquer modalidade de biópsia descarta a possibilidade de câncer.

**Escola Técnica Estadual Professor Massuyuki Kawano**  
**CARDERNO DE QUESTÕES**

24. A gastrostomia ou jejunostomia é uma terapêutica de suporte ao paciente com neoplasia de vias aéreas superiores. Quanto aos cuidados de enfermagem com a gastrostomia/jejunostomia é **INCORRETO** afirmar:

- a) Após a dieta, manter paciente sentado ou com a cabeceira elevada por pelo menos 15 minutos ou a critério médico.
- b) Observar diariamente a marcação ou numeração da sonda.
- c) Lavar a sonda com 20 a 50 ml de água filtrada após dietas e/ou medicações.
- d) Não administrar a dieta na gastrostomia rapidamente, pode causar náusea e vômito.

25. A abordagem dos cuidados paliativos deve ser multidisciplinar, com o objetivo de oferecer qualidade de vida aos pacientes, salvaguardando sua dignidade de vida até os últimos momentos. Quanto à etiologia da dor é **CORRETO** afirmar:

- a) A dor somática e a dor visceral são classificadas como neuropáticas porque o câncer é uma doença degenerativa.
- b) A dor aguda tem início súbito, costuma ser recorrente e está associada a aumento da pressão arterial, taquicardia e agitação psicomotora.
- c) Na dor neuropática podem ocorrer algumas sensações anormais como, por exemplo, a alodínea que significa uma resposta exagerada a um estímulo que não é doloroso.
- d) A dor crônica é um prolongamento da dor aguda, por isso são identificados sinais de aumento da pressão arterial, taquipnéia, ansiedade, taquicardia e agitação psicomotora no paciente.

26. Quanto a administração de analgésicos para o controle da dor no paciente oncológica, é **CORRETO** afirmar:

- a) Os analgésicos devem utilizados segundo a demanda do paciente.
- b) Os analgésicos devem ser administrados a cada 3 a 6 horas.
- c) A intervenção cirúrgica nos nervos apropriados é mais indicada que os analgésicos.
- d) A sequência de administração de analgésico deve ser: não opióide (dipirona); opióide fraco (morfina) e por fim opióide forte (codeína).

27. Quanto às intervenções não farmacológicas no controle da dor no paciente oncológico é **INCORRETO** afirmar:

- a) O uso de bolsas de água quente com temperatura de 40°C a 45°C, durante 20 a 30 minutos, três a quatro vezes ao dia porque o calor reduz a dor por aumentar a isquemia tecidual.
- b) Uso de bolsas de água fria de duas a três vezes por dia, durante 10 a 15 minutos porque o frio reduz a velocidade de condução nervosa, diminuindo a chegada de estímulos nervosos ao sistema central.
- c) Exercícios suaves de contração e alongamento auxiliam no alívio da dor oriunda do repouso prolongado.

d) A analgesia do frio está relacionada ao espasmo vascular e a do calor ocorre devido ao aumento do fluxo sanguíneo no tecido.

28. No controle da dor são utilizados os analgésicos adjuvantes ou coanalgésicos. Assinale a alternativa que contempla os analgésicos adjuvantes:

- a) antidepressivos; anticonvulsivantes; anestésicos locais; corticosteróides.
- b) anti-inflamatórios não esteróides; antidepressivos; anestésicos locais; antieméticos.
- c) anticonvulsivantes; benzodiazepínicos; barbitúricos; anti-histamínicos.
- d) anti-inflamatórios não esteróides; anti-histamínicos; antipsicóticos; corticosteróides.

29. Os pacientes submetidos a iodoterapia recebem orientação antecipatória e permanente durante seu período de internação. Identifique a orientação **INCORRETA** após a administração da dose da iodoterapia:

- a) Fazer bochechos de suco de limão para prevenir a inflamação nas glândulas salivares, estimulando a salivação, já que essas glândulas também concentram o iodo radioativo.
- b) Ao usar o vaso sanitário dar 3 descargas, homens devem urinar sentados, é proibido urinar no box durante o banho.
- c) Deverá permanecer em jejum (absoluto) por um período de 2 horas após a administração da iodoterapia.
- d) Após 4 horas da administração da dose da iodoterapia, será autorizado apenas um visitante por 15 minutos.

30. A instilação de agentes antineoplásicos via cateter vesical de demora é comum em pacientes com diagnóstico de câncer de bexiga. Quanto ao procedimento é **CORRETO** afirmar:

- a) No cateterismo é utilizado cateter de duas vias e o profissional usa paramentação adequada.
- b) Durante 1 hora, realiza-se mudanças de decúbito no paciente a cada 15 minutos.
- c) O paciente permanecerá com o cateter por pelo menos uma semana para garantir a eficácia do tratamento.
- d) O conteúdo drenado deverá ser descartado em vaso sanitário, seguido de 3 descargas.

**Escola Técnica Estadual Professor Massuyuki Kawano**  
**CARDERNO DE QUESTÕES**

31. A radioterapia e a quimioterapia podem levar o paciente em tratamento a diversos efeitos colaterais.

- A) Xerostomia
- B) Mucosite
- C) Trismo
- D) Disgeusia

( ) Caracteriza-se por atrofia epitelial, edema, eritema e pelo aparecimento de ulcerações, que podem acometer toda a mucosa bucal, gerando dor e desconforto, prejudicando a fala, a deglutição e a alimentação.

( ) Dificuldade de abertura da boca após o tratamento do câncer de cabeça e pescoço.

( ) Ocorre quando a língua está localizada no campo da irradiação e as papilas gustativas sofrem seu efeito.

( ) Alteração na quantidade e na qualidade da saliva produzida pelo paciente submetido a radioterapia de cabeça e pescoço.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) A; D; C; B
- b) D; B; A; C
- c) B; C; D; A
- d) C; A; B; D

32. Leia as afirmativas abaixo sobre os cuidados com pacientes mastectomizados e assinale a alternativa **CORRETA**:

I. Pacientes submetidos ao esvaziamento axilar não têm o sistema linfático do lado operado tão eficiente por isso evitar picadas de insetos e mordidas de animais.

II. Usar loção depilatória ou tesoura para remover os pêlos da axila do lado operado.

III. No pós-operatório da mastectomia, as atividades diárias devem ser realizadas normalmente com o braço do lado da cirurgia: se pentear, tomar banho, se vestir e comer.

- a) I e II estão corretas
- b) I e III estão corretas
- c) II e III estão corretas
- d) I, II e III estão corretas

33. A manipulação do sistema endócrino é um procedimento bem estabelecido para o tratamento de algumas neoplasias malignas hormoniossensíveis. Sobre hormonioterapia é **CORRETO** afirmar:

- a) No tratamento do carcinoma de endométrio é usual a associação da hormonioterapia com a cirurgia.
- b) O uso isolado da hormonioterapia tem finalidade curativa na grande maioria das indicações.
- c) A orquiectomia é uma hormonioterapia ablativa que pode ser indicada as mulheres na pré-menopausa com carcinoma de mama e metástases ósseas.
- d) O objetivo da hormonioterapia medicamentosa é a supressão de hormônios circulantes.

34. Os cuidados de enfermagem do paciente onco-hematológico devem incluir:

I. Orientar higiene corporal e oral rigorosa e consumo de alimentos preferencialmente cozidos e assados devido à neutropenia.

II. Observar a coloração da pele e mucosas e a frequência cardíaca, na busca de sinais de anemia.

III. Evitar a administração de medicamentos por via intramuscular em pacientes com plaquetopenia.

- a) I, II e III estão corretas
- b) I e II estão corretas
- c) I e III estão corretas
- d) II e III estão corretas

35. O transplante de células progenitoras hematopoéticas é uma modalidade terapêutica utilizada principalmente na área onco-hematológica. Assinale a alternativa **CORRETA**:

I. É uma modalidade de tratamento no qual a medula óssea doente do paciente é substituída por células-tronco normais, com o objetivo de reconstituir a medula óssea normal.

II. Transplante alogênico é quando as células provêm do próprio paciente e transplante autólogo é quando as células provêm de doador compatível, seja ele da família ou pessoa não aparentada.

III. O receptor do transplante é submetido a altas doses de quimioterápicos e/ou radioterapia com duração em média de oito dias e, na sequência recebe a infusão da medula óssea.

- a) I e II estão corretas
- b) I e III estão corretas
- c) II e III estão corretas
- d) I, II e III estão corretas

36. A interrupção ou dano no sistema linfático é uma complicação crônica do tratamento do câncer muito comum após intervenção cirúrgica e radioterapia, levando ao acúmulo de fluidos no meio intersticial. Essa condição é denominada:

- a) edema idiopático
- b) mixedema
- c) linfedema
- d) edema intersticial

37. No tratamento do câncer de laringe há de se considerar a laringectomia total que pode implicar em traqueostomia definitiva. Assinale a alternativa **CORRETA** quanto aos cuidados de enfermagem ao paciente traqueostomizado:

I. O procedimento de aspiração deve seguir as seguintes ações: oclusão do látex; introdução cuidadosa da sonda; aspiração por 3 a 5 segundos; e retirada lenta da sonda com movimentos circulares, observando durante o procedimento sinais de hipóxia e arritmias.

II. A higienização do estoma consiste na remoção das secreções, úmidas ou ressecadas que se acumulam ao redor e deve ser realizada com técnica asséptica, com todos os materiais estéreis.

**Escola Técnica Estadual Professor Massuyuki Kawano**  
**CARDERNO DE QUESTÕES**

III. O profissional Enfermeiro tem competência técnico-científica para a execução da troca da cânula de traqueostomia (externa e interna), tanto no ambiente hospitalar como no ambiente domiciliar.

- a) I e II estão corretas
- b) I e III estão corretas
- c) II e III estão corretas
- d) I, II e III estão corretas

38. Para diversos tipos de câncer são realizados ciclos de quimioterapia. Quanto ao ciclo de tratamento quimioterápico é **CORRETO** afirmar:

- a) O conceito de ciclo de tratamento não se aplica quando o medicamento utilizado é administrado por via oral.
- b) Ciclo de quimioterapia é o número de aplicações e intervalo entre duas doses de tratamento.
- c) O ciclo de tratamento independe do medicamento utilizado, da combinação de medicamentos escolhida e da doença que se está tratando.
- d) O conceito de ciclo de tratamento não se aplica a poliquimioterapia, pois, esta é realizada em uma única aplicação.

39. Quanto as aplicações de radioterapia externa é **CORRETO** afirmar:

- a) o número de aplicações pode variar de uma aplicação a 42.
- b) as aplicações são semanais e realizadas em dias úteis.
- c) o paciente permanece na sala de tratamento entre 2 a 3 horas.
- d) o paciente que recebe radioterapia externa permanece radioativo por cerca de 24 horas.

40. Quanto ao efeito emetogênico dos quimioterápicos antineoplásicos é **CORRETO** afirmar:

- a) a infusão rápida dos antineoplásicos reduzem seu efeito emetogênico.
- b) todas as drogas antineoplásicas têm o mesmo potencial emetogênico.
- c) as administrações arteriais são menos emetogênicas que as venosas.
- d) a combinação de múltiplos quimioterápicos ameniza os efeitos emetogênicos.

41. (TJ-SC - Juiz Substituto – FCC/2017) A Lei de Acesso à Informação Pública – Lei Federal nº 12.527/2011

- a) cria hipótese de responsabilidade objetiva pela divulgação indevida de informações, sendo que tal responsabilidade também é aplicável aos particulares que, em virtude de vínculo com órgão ou entidade pública, tenham acesso a informações sigilosas.
- b) não se aplica a todos os entes da Administração Pública, visto que é incompatível com o regime das empresas públicas e sociedades de economia mista, regidas por lei própria (Lei Federal nº 13.303/2016).

c) postula que, segundo o princípio *accessorium sequitur principale*, quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, as demais partes tornam-se também de acesso restrito.

d) aponta como dever dos órgãos e entidades públicas promover a divulgação de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, por sítio oficial na internet; todavia, os Municípios de menos de cem mil habitantes estão dispensados da exigência.

42. (PC-AC - Delegado de Polícia Civil – IBADE/2017) Quanto à Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), assinale a alternativa correta.

- a) O prazo máximo de restrição de acesso à informação classificada como ultrassecreta é 30 (trinta) anos.
- b) Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação.
- c) A Administração Pública pode condicionar o deferimento do pedido de acesso a informações à apresentação, pelo interessado, dos motivos determinantes da solicitação.
- d) Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, o pedido de acesso à informação deverá ser negado pela Administração Pública.

43. (UFPA - Assistente em Administração - UFPA/2017)

Em relação à Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso à informação, é **CORRETO** afirmar:

- a) Os órgãos e entidades do poder público devem assegurar a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, integridade e eventual restrição de acesso.
- b) Não se aplica aos Estados e Municípios, visto que é uma lei Federal.
- c) Foi criada para proteger informações sigilosas que colocam em risco a soberania nacional.
- d) Informações sigilosas são aquelas submetidas por tempo indeterminado à restrição de acesso público.

44. (SAAE de Barra Bonita – SP - Procurador Jurídico - Instituto Excelência/2017) De acordo com a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011 podemos dizer que o acesso à informações públicas será assegurada mediante:

- a) Realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou a outras formas de divulgação.
- b) Realização de audiências e participação de entidades públicas que irá conceder o acesso imediato à informação disponível.
- c) Realização de audiências e informações de conhecimento para toda população.
- d) Nenhuma das alternativas.

**Escola Técnica Estadual Professor Massuyuki Kawano**  
**CARDERNO DE QUESTÕES**

45. Assinale a alternativa correta, considerando o disposto na Lei nº 12.527, de 18/11/2011, sobre o procedimento de acesso à informação:

a) Apenas a pessoa sobre quem se busca obter informações poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades vinculados à referida lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.

b) Apenas a pessoa sobre quem se busca obter informações poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades vinculados à referida lei, por qualquer meio legítimo, sendo dispensável que o pedido contenha a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.

c) Somente o Ministério Público poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades vinculados à referida lei, por qualquer meio legítimo, sendo dispensável que o pedido contenha a identificação do requerente e a especificação da informação requerida

d) Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades vinculados à referida lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida

46. Segundo o parágrafo único, do Artigo 5º, da Seção II, do Decreto nº 58.052, de 16 de maio de 2012, integram a política estadual de arquivos e gestão de documentos: fonte

a) Os serviços de protocolo e arquivo dos órgãos e entidades e os Serviços de Informações ao Cidadão – SIC;

b) As Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso - CADA;

c) O Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos Informações - SPdoc;

d) Todas as anteriores.

47. Segundo o Artigo 6º, da Seção II, do Decreto nº 58.052, de 16 de maio de 2012, para garantir efetividade à política de arquivos e gestão de documentos, os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual deverão:

I - providenciar a elaboração de planos de classificação e tabelas de temporalidade de documentos de suas atividades-fim, a que se referem, respectivamente, os artigos 10 a 18 e 19 a 23, do Decreto nº 48.897, de 27 de agosto de 2004;

II - cadastrar todos os seus documentos no Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações - SPdoc.

III - controlar o cumprimento de prazos para descarte de informações obsoletas por parte dos setores produtores de documentos, previstos no artigo 15 deste decreto.

a) Apenas I está correta.

b) Apenas II está correta.

c) I e II estão corretas.

d) I e III estão corretas.

48. Segundo o §1º, do Artigo 15, da Seção IV, do Decreto nº 58.052, de 16 de maio de 2012, na impossibilidade de conceder o acesso imediato, o Serviço de Informações ao Cidadão - SIC do órgão ou entidade, em prazo não superior a 20 (vinte) dias, deverá:

I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;

II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido;

III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.

a) Apenas I está correta.

b) I, II e III estão corretas.

c) Apenas II está correta.

d) I e II estão corretas.

49. (UFF - Auxiliar em Administração – COSEAC/2017)

Para efeito da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, lei de acesso à informação, considera-se a autenticidade como a:

a) qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados.

b) qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino.

c) qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.

d) qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema.

50. (TRF - 2ª REGIÃO - Analista Judiciário - Arquivologia

-CONSULPLAN/2017) "A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa

norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades."

(Disponível em [http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/conheca-seu-direito/a-lei-de-acesso-a-informacao.](http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/conheca-seu-direito/a-lei-de-acesso-a-informacao))

Em relação à Lei de Acesso à Informação, assinale a alternativa INCORRETA.

a) O Estado deverá controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas por seus órgãos.

b) O acesso à informação classificada como sigilosa cria a obrigação para aquele que a obteve de resguardar o sigilo.

c) As informações pessoais terão seu acesso restrito pelo prazo máximo de sessenta e cinco anos a partir de sua produção.

d) A classificação de informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão que conterà a identificação da autoridade que a classificou.